

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Grandes Cultures

Bulletin Technique n°34 du 21 octobre 2003 - 1 page - Numéro ordre postal : 83

Céréales

STADES : levée à 2 feuilles.

Ravageurs

Les cicadelles *Psammotettix alienus* ont été encore très nombreuses la semaine dernière dans certains sites (voir tableau). Si les conditions actuelles sont susceptibles de ralentir leur activité, le risque demeure compte tenu des quantités records d'insectes piégés cette année.

captures de cicadelles

Lieu	14 au 20/10
77- Amponville	16
77- Château Landon	5
77- Egreville	0
77- Episy	28
77- Fontaine le port	14
77- Marolles	4
77-Chailly en Brie	204
77-Chambry	16
77-Chaumes en Brie	12
77-Crisenoy	10
77-Maisoncelles en Brie	157
77-Touquin	152
78-Neauphlette	1
78-Plaisir	8
91- Mespuits	50
91- Pecqueuse	2
95-Chars	19
95-Guiry en Vexin	92
95-Le Mesnil Aubry	6

Au niveau des pucerons, les infestations restent généralement nulles ou faibles (moins de 5% de plantes porteuses d'ailés).

Colza

STADES : 6 à 10 feuilles.
Jaunissement important de certaines parcelles désherbées avec des produits à base de clomazone.

Ravageurs

Les altises ont été moins actives que la semaine précédente avec seulement 1 site sur 3 avec des captures, notamment dans le Nord Seine et Marne et surtout dans les Yvelines avec des captures encore importantes à Buchelay (35) et Gazeran (19). Pour le charançon du bourgeon terminal, le vol est encore plus limité avec 1 site sur 7 avec des captures. Enfin une seule capture de baris a été enregistrée cette semaine à Saclas (91).
Les conditions climatiques prévues cette semaine devraient encore réduire l'activité des insectes.

Pour les pucerons (verts mais aussi parfois quelques cendrés), sur les parcelles non protégées, on a des situations où les infestations restent nulles à faibles (0 à 10% de pieds) et d'autres où les colonisations sont très fortes avec 85-95% de pieds porteurs et 10-20 pucerons / plante comme à Chailly en Brie (77) et Guiry en Vexin (95).
Fin du risque compte tenu du stade.

Sur une parcelle du Val d'Oise, à Chars, nous avons trouvé une attaque importante de mouche du chou : larves blanchâtres qui creusent des galeries brunes sur le pivot. La lutte contre ce ravageur ne peut s'effectuer que de façon préventive avec des insecticides du sol.

Phoma

Des symptômes sur feuilles s'observent dans quelques parcelles, mais à des niveaux faibles : 10 à 30% de pieds porteurs d'une tache. C'est le cas par exemple dans l'Essonne et le sud Yvelines :
- Ablis (78), Gazeran (78), Lisses (91) sur la variété PR45W04,
- Monnerville (91) Les Granges le Roi (91) sur la variété EXPERT,
- Jaulnes (77) sur la variété EXPLUS.

Le phoma ne présente toujours pas de caractère de gravité.

L'oïdium fait son apparition dans certaines parcelles.



Céréales
Colza
Point ravageurs.

Service Régional de la Protection des Végétaux ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON Ile de France

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis
Directeur gérant : J. BOULUD

Publication périodique
C.P.P.A.P n°0904 B 00536
ISSN n°0767-5542

Tarif individuel 2003 : 65 euros